



PATIENTENINFORMATION

COVID-AUFRISCHUNGS-IMPfung

In der aktuellen Empfehlung des Gesundheitsministeriums¹ wird für alle Personen über 80 Jahren, welche im Zeitraum nach der 3. COVID-Impfung nicht an Corona erkrankt sind, eine 4. COVID-Impfung empfohlen.

Unsere Impftermine bis zur Sommerpause:

Freitag, 20.05.2022

Freitag, 03.06.2022

Freitag, 17.06.2022

Freitag, 01.07.2022

Wir impfen an diesen Tagen in unserer Praxis, ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarung!

Unser Impftermin im Herbst 2022: **Samstag, 17.9.2022!**

Gerne können Sie sich mittels Email (ordination.fischer@medway.at) oder Anruf (0512/378 201) für diesen Termin vormerken lassen!

Folgende Impf-Empfehlung zur 4. Teilimpfung (4. TI) gilt derzeit:

NICHT GENESEN nach der 3. COVID-Teilimpfung (3. TI), aufgeteilt nach Altersgruppen:

- über 80 Jahre -> 4. TI 4-6 Monate nach 3. TI
- 66-79 Jahre -> 4. TI auf Wunsch 4-6 Monate nach 3. TI
- 12-65 Jahre -> 4. TI auf Wunsch 4-6 Monate nach 3. TI
- Risikopersonen (altersunabhängig) -> 4. TI auf Wunsch 4-6 Monate nach 3. TI
- 5-11 Jahre -> keine 4. TI (3. TI siehe unten)
- unter 5 Jahre -> dzt. keine Covid-Impfung empfohlen

GENESEN VOR der 3. TI, über 5 Jahre: spielt keine Rolle für die 4. TI

GENESEN NACH der 3. TI, über 5 Jahre: 4. TI im Herbst 2022

¹ Quelle: Anwendungsempfehlungen des nationalen Impfgremiums: ([https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5ce67ff1-8dfc-401e-9f85-3327abec5dc0/COVID-19-Impfungen_Awendungsempfehlung_des_Nationalen_Impfgremiums_10.0_\(Stand_25.04.2022\).pdf](https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5ce67ff1-8dfc-401e-9f85-3327abec5dc0/COVID-19-Impfungen_Awendungsempfehlung_des_Nationalen_Impfgremiums_10.0_(Stand_25.04.2022).pdf))

PATIENTENINFORMATION



Empfehlungen für die 1./2. und 3. Teilimpfung (1./2./3. TI)

NICHT GENESEN NACH 2.TI:

- über 12 Jahre -> 3. TI 6 Monate nach 2. TI
- 5-11 Jahre -> 3. TI 6 Monate nach 2. TI
spätestens aber im Herbst 2022 bei Schulbeginn
- unter 5 Jahre -> dzt. keine Empfehlung

GENESEN NACH 2. TI, über 5 Jahre -> 3. TI 6 Monate nach abgelaufener Infektion

GENESEN NACH 1. TI, über 5 Jahre -> 2. TI 4 Wochen nach abgelaufener Infektion

GENESEN VOR 1.TI, über 5 Jahre -> 1. TI 4 Wochen nach abgelaufener Infektion